

Druhy zranění pro disciplínu ZPV kategorie dorostu
ročník 2017 - 2018

MDLOBA	
Příznaky	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zpomalení tepu, který je slabě hmatný 2. Výrazná bledost, obličej je pokryt potem 3. Pocit závratí, potácení, nevolnost
Způsob ošetření (pomocí běžně dostupných prostředků např. lékárníčky)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umožnit postiženému lepší prokrvení mozku - tzn. nohy výš než hlava, uvolnit těsný oděv 2. Umožnit přísun čerstvého vzduchu 3. Podáváme tekutiny
Transport	NE

ÚPAL	
Příznaky	<ol style="list-style-type: none"> 1. Červené zbarvení kůže 2. Velká tělesná teplota 3. Únava, malátnost, zmatenost, zvracení, rychlý tep a poruchy vědomí
Způsob ošetření (pomocí běžně dostupných prostředků např. lékárníčky)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zamezení dalšího působení tepla 2. V případě bezvědomí - stabilizovaná poloha 3. Snižování tělesné teploty - studené zábaly nebo sprcha, podávání studených nápojů
Transport	NE ANO - v případě bezvědomí

CIZÍ TĚLESA A PŘEDMĚTY V RANÁCH	
Příznaky	<ol style="list-style-type: none"> 1. Víme o kontaktu s kouskem dřeva, kovu, skla 2. Zaklíněné cizí těleso může být viditelné 3. Bolestivost a pohmatová citlivost
Způsob ošetření (pomocí běžně dostupných prostředků např. lékárníčky)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jedná-li se o třísku vyjmeme ji například pinzetou, dezinfikace 2. V případě velkého tělesa nevyndaváme, pouze obložíme gázou a lehce zakryjeme
Transport	NE - jedná-li se o předmět, který lze odstranit pinzetou ANO - v případě velkých předmětů, které nemůžeme odstranit sami

Druhy zranění pro disciplínu ZPV kategorie dorostu
ročník 2017 - 2018

KLÍŠTĚ	
Příznaky	<ol style="list-style-type: none">1. Svědění v místě, kde je klíště zakouslé2. Klíště je viditelně zakouslé
Způsob ošetření (pomocí běžně dostupných prostředků např. lékárníčky)	<ol style="list-style-type: none">1. Klíště bychom neměli zamazat krémem nebo olejem. Místo desinfikujeme2. Klíště kývavým nebo krouživým pohybem např. za pomoci pinzety odstraníme3. Po vyndání opět desinfikujeme
Transport	NE

PUCHÝŘE	
Příznaky	<ol style="list-style-type: none">1. Vznikají při popáleninách nebo při nevhodném oblečení či obuvi2. Zarudnutí3. Tenkostěnná bublina vyplněná tkáňovou tekutinou
Způsob ošetření (pomocí běžně dostupných prostředků např. lékárníčky)	<ol style="list-style-type: none">1. Nepropichujeme2. Sterilně je překryjeme produšným obvazem nebo polštářkovou náplastí
Transport	NE